

Prospect: Informații pentru consumator/pacient
Uroholum picături orale, soluție
Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Uroholum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Uroholum
3. Cum să luați Uroholum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Uroholum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Uroholum și pentru ce se utilizează

Uroholum reprezintă un medicament combinat de origine vegetală. Componentele din compoziția Uroholum ușor se absoarbe în sânge și stimulează fluxul și circulația sângelui în rinichi și ficat, intensifică secreția urinei și a bilei, normalizează tonusul musculaturii netede a căilor urinare și a vezicii biliare, reduc inflamația din căile urinare și rinichi, are un efect cu acțiune bactericidă, diuretică, coleretică, antispastică.

Uroholum cu efect antiazotemic elimină din organism ureea, acidul uric și clorurile.

Uroholum contribuie la eliminarea nisipului și a calculilor mici din rinichi, vezica urinară și vezica biliară.

Uroholum se utilizează ca adjuvant în caz de:

- infecții acute și cronice ale căilor urinare și rinichilor (cistite, pielonefrite, uretrite);
- nefrite; nefroze;
- prezența pietrelor (calculilor) în rinichi, profilaxia formării calculilor după înlăturarea lor;
- inflamații cronice ale vezicii biliare (colecistite), dischinezii ale căilor biliare, calculi în vezica biliară.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Uroholum

Nu luați Uroholum:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți modificări ale proprietăților reologice ale sângelui;
- dacă aveți inflamații ale căilor biliare (icter);

- dacă aveți gastrită (inflamația mucoasei stomacului), ulcer gastric sau duodenal.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Uroholum, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Utilizarea cu grijă la pacienții care suferă de arsuri la stomac, ca urmare a refluxului gastro-esofagian, (poate provoca apariția și/sau creșterea arsurilor la stomac);

A nu se administra în caz dacă diametrul calculilor depășește 3 mm.

Copii și adolescenți

Uroholum sub formă de picături orale, soluție se utilizează la copii cu vârsta peste 12 ani.

Uroholum împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripția medicului.

Uroholum împreună cu alimente, băuturi și alcool

Uroholum se administrează înainte de mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă administrarea preparatului în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Deoarece produsul conține alcool nu se recomandă de a conduce vehicule și de a folosi utilaje în timpul administrării preparatului.

Uroholum conține o cantitate mică de etanol – mai puțin de 100 mg/doză.

3. Cum să luați Uroholum

Luăți întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze recomandate:

Adulți și adolescenți: câte 10-20 picături dizolvate într-o cantitate mică de apă de 3 ori pe zi. Durata administrării constituie 5-30 zile. La necesitate sunt posibile cure repetate.

Mod de administrare

Administrare orală.

Uroholum se administrează înainte de mese.

Dacă luați mai mult Uroholum decât trebuie

Dozele foarte mari de medicament pot determina greață, vomă, amețeli. Adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau mergeți la spitalul cel mai apropiat, dacă ați luat mai mult Uroholum decât v-a fost recomandat de către medic.

Dacă uitați să luați Uroholum

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați tratamentul așa cum v-a fost prescris de către medic.

Dacă încetați să luați Uroholum

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvențele reacțiilor adverse sunt definite după cum urmează: - foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane; - frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane; - mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane; - rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane; - foarte rare: pot afecta până la 1 din 10.000 persoane; - cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

Frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- amețeli;
- manifestări dispeptice (grețuri, vomă);

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau email: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Uroholum

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

După deschiderea flaconului la respectarea condițiilor de păstrare termenul de valabilitate nu se modifică.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Uroholum

- Substanțele active sunt: 1 ml de produs conține extract hidroalcoolic (1:1) (extractant – etanol 40%) din amestec de plante: fructe de morcov sălbatic (*Dauci carotae fructus*) – 200 mg; frunze de Orthosiphon (*Orthosiphonis staminei folia*) – 180 mg; iarbă de troscot (*Poligoni avicularis herba*) – 150 mg; mătase de porumb (*Zea maydis styli cum stigmatis*) – 120 mg; flori de soc negru (*Sambuci nigrae flores*) – 100 mg; iarbă de coada-calului (*Equiseti herba*) – 100 mg; conuri de hamei (*Lupuli flos*) – 50

mg; muguri de mesteacan (*Betulae gemmae*) – 50 mg; iarbă de sunătoare (*Hyperici herba*) – 40 mg; frunze de mentă (*Menthae piperitae folia*) – 10 mg.

- *Celelalte componente sunt:* absent.

Cum arată Uroholum și conținutul ambalajului

Uroholum se prezintă sub formă de lichid de culoare maro închis, având un miros aromat specific. La depozitare poate apărea precipitat.

Este disponibil în cutie cu 1 flacon a câte 25 ml (40 ml) picături orale, soluție.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

DKP Fabrica farmaceutică SRL,
str. Koroliova, 4, s-l Stanișovka, r-ul Jitomir,
reg. Jitomir, 12430, Ucraina

Fabricantul

DKP Fabrica farmaceutică SRL,
str. Koroliova, 4, s-l Stanișovka, r-ul Jitomir,
reg. Jitomir, 12430, Ucraina

Acest prospect a fost revizuit în August 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>