

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

UBICHINON COMPOSITUM soluție injectabilă

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Ubichinon compositum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ubichinon compositum
3. Cum să utilizați Ubichinon compositum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ubichinon compositum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE UBICHINON COMPOSITUM ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ubichinon compositum este un medicament homeopat, fără indicații terapeutice aprobate.

Ubichinon compositum este indicat ca adjuvant în stimularea mecanismelor de luptă a organismului împotriva toxinelor, în scopul de a reactiva enzimele blocate în caz de diferite defecte enzimatică și a bolilor degenerative.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI UBICHINON COMPOSITUM

Nu utilizați Ubichinon compositum:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerată la pct. 6);

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Ubichinon compositum, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Copii

Nu există informații clinice privitor la utilizarea preparatului la copii.

Ubichinon compositum împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Ubichinon compositum nu interacționează cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu este cunoscut ca diluțiile homeopatice ale componentelor prezente în compoziția preparatului să fie toxice în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Ubichinon compositum nu influențează capacitatea de a conduce vehicule să de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI UBICHINON COMPOSITUM

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă de 1-3 ori pe săptămână.

Doza inițială sau în caz de acutizări

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Mod de administrare

Preparatul poate fi administrat subcutanat, intradermal, intramuscular sau intravenos.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat.

Dacă utilizați mai mult Ubichinon compositum decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Ubichinon compositum

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Ubichinon compositum

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Ubichinon compositum:

- stări caracterizate prin scăderea nivelului de oxigen din sânge;
- umflarea limbii;
- umflături, mâncărimi.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ UBICHINON COMPOSITUM

A se păstra în ambalaj original, ferit de lumină, la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Ubichinon compositum

1 fiolă (2,2 ml soluție injectabilă) conține:

Substanțe active :

Acidum acetylsalicylicum	D10	22,0 mg
Acidum ascorbicum	D6	22,0 mg
Acidum L(+)-lacticum	D6	22,0 mg
Acidum thiocticum	D8	22,0 mg

Adenosinum triphosphoricum	D10	22,0 mg
Anthrachinonum	D10	22,0 mg
Coenzym A	D10	22,0 mg
Colchicum autumnale	D4	22,0 mg
Conium maculatum	D4	22,0 mg
Galium aparine	D6	22,0 mg
Histaminum	D10	22,0 mg
Hydrastis canadensis	D4	22,0 mg
Hydrochinonum	D8	22,0 mg
Magnesium gluconicum	D10	22,0 mg
Manganum phosphoricum	D8	22,0 mg
Nadidum	D10	22,0 mg
Naphthochinonum	D10	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nicotinamidum	D6	22,0 mg
p-Benzochinonum	D10	22,0 mg
Podophyllum peltatum	D4	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	22,0 mg
Sulfur	D8	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	22,0 mg
Trichinoylum	D10	22,0 mg
Ubidecarenonum	D10	22,0 mg
Vaccinium myrtillus	D4	22,0 mg

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru injecții.

Cum arată Ubichinon compositum și conținutul ambalajului

Ubichinon compositum se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, lipsită de miros.

Conținutul ambalajului

Câte 2,2 ml de soluție injectabilă în fiole din sticlă. Câte 5 sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH
 Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
 76532 Baden-Baden
 Germania
 Telefon: 0049 7221 501 00
 Fax: 0049 7221 501 485
 e-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH
 Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
 76532 Baden-Baden
 Germania

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2016

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>