

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Aecol soluție uleioasă

Combinăție

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Aecol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aecol
3. Cum să luați Aecol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aecol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Aecol și pentru ce se utilizează

Aecol conține o combinație de substanțe active - vitamine solubile în grăsimi, inclusiv vitamina A, vitamina E, vitamina K.

Aecol este recomandat pentru:

Utilizare orală: tratamentul complex al ulcerului gastric și duodenal, stare după rezecția stomacului, colită ulceroasă nespecifică.

Utilizare locală: fisuri a mucoasei rectului (partea distală a intestinului gros), inclusiv stări după rezecția fisurilor; inflamația unei părți a intestinului gros (proctosigmoidită), hemoroizi; scleroză progresivă a pielii și în unele cazuri a organelor interne (sclerodermie), ulcere de decubit, trofice și varicoase; eroziuni ale colului uterin, inflamația mucoasei colului uterin (endocervicită), inflamația mucoasei vaginului (vaginită), plăgi septico-necrotice, arsuri infectate de gradul II-III, stare după transplant de piele (autodermoplastie).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aecol

Nu luați Aecol:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

**CONCERNANT MEDICAMENTULUI
ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE**
MD-2028, mun. Chișinău, str. Korolenko, 2/1
**SECTIA AUTORIZARE MEDICAMENTE
ȘI SUPLIMENTE ALIMENTARE**

Pentru utilizarea orală:

- dacă sunteți gravidă
- dacă alăptăți
- dacă suferii de funcția mărită a glandei tiroide (tireotoxicoză)
- dacă suferii de o boală a rinichilor numită glomerulonefrită cronică.

Acelor nu se utilizează la copii cu vârstă sub 14 ani.

Atenționări și precauții

Înainte de începerea tratamentului, comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- aveți pietre în căile biliare
- aveți pancreatită cronică
- aveți ateroscleroză pronunțată a arterelor coronariene
- ați suferit infarct miocardic
- aveți probleme cu rinichii (nefrită acută și cronică)
- aveți risc crescut de tromboembolii
- aveți insuficiență a inimii (insuficiență cardiacă)
- aveți probleme severe cu ficatul și căile biliare
- luați alte medicamente care conțin vitaminele A, E și K.

În caz de tratament îndelungat vi se vor efectua teste de sânge pentru a monitoriza indicii biochimici și de coagulare a sângei.

Utilizarea la copii și adolescenti

Acelor nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârstă sub 14 ani.

Acelor împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau să ar putea să luați orice alte medicamente.

În special spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- estrogeni – pentru tulburări hormonale sau pentru contracepție
- preparate de fier – pentru anemie (scăderea nivelului de hemoglobină și globule roșii în sânge)
- preparate de argint – pentru boli de piele
- produse care reacționează cu substanțele alcaline
- acid clorhidric – pentru aciditate redusă a stomacului
- glucocorticoizi, antiinflamatoare steroidiene și nesteroidiene (diclofenac sodic, ibuprofen, prednizolon, acid acetilsalicilic, etc) – pentru boli inflamatorii și reumatische
- glicozide cardiace (digitoxină, digoxină) – pentru probleme cu inima
- anticonvulsive – pentru convulsii
- anticolaglante indirecte (inclusiv derivați de cumarină și hidantionă) – pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge
- antiacide, sucralfat – pentru aciditate sporită a stomacului

- colestiramină, colestipol - pentru scăderea nivelului de colesterol în sânge
- uleiuri minerale - utilizate ca substanțe auxiliare în compoziția unor medicamente
- dactinomicină – pentru unele tipuri de cancer.

Aecol împreună cu alimente, băuturi și alcool

Oral medicamentul se va lua cu 30-40 min. înainte de mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament este contraindicat în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra vitezei de reacție în caz de conducere a vehiculelor sau de folosire a utilajelor.

3. Cum să luați utilizați Aecol

Luați utilizăți întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Oral: medicamentul se administrează cu 30-40 min. înainte de mese. Adulți – câte 5-10 ml (1-2 lingurițe de ceai) de 2-3 ori pe zi, timp de 4-5 săptămâni.

La necesitate, după consultarea medicului, cura de tratament poate fi repetată peste 6 luni.

Local: în proctologie se administrează sub formă de tampoane îmbibate cu soluție, sau sub formă de microclizme câte 30-50 ml timp de 10-12 zile; în ginecologie – sub formă de tampoane îmbibate cu soluție. Cura de tratament – 1-15 proceduri.

Cutanat: se aplică peste o zi pe sectoarele afectate, curățate în prealabil de masele necrotice, sub formă de pansamente uleioase, până la apariția granulațiilor și epitelizării.

Dacă luați mai mult Aecol decât trebuie

Ingestia unei supradoze poate conduce la dureri de cap, somnolență, apatie, greață, vărsături, diaree, senzație de dureri în oasele membrelor inferioare, tromboze, tromboembolie, mărirea cantității de colesterol în sânge.

Dacă apar aceste efecte, intrerupeți utilizarea medicamentului și consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Zonele năvălite de căldură și refrederă - înălțătoare din amfetamină

Dacă uitați să luați utilizați Aecol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Aecol

Luați medicamentul atât timp, cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă opriți tratamentul prea devreme, boala poate reveni.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

- oboseală sporită, slăbiciune, apatie, insomnie, creșterea temperaturii corpului, dureri de cap, somnolență, irascibilitate
- tulburări de mers, senzație de durere în oasele membrelor inferioare
- tulburări dispeptice sub formă de disconfort în partea superioară a abdomenului, lipsa poftei de mâncare, uscăciune în gură, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree, ulcerății în cavitatea bucală
- mâncărime, roșeață, erupții cutanate, uscăciunea pielii, descuamarea pielii, înroșirea feței
- cădere părului
- tulburări ale funcției menstruale
- mărirea cantității de protrombină, trombină, bilirubină în sânge (hiperprotrombinemie, hypertrombinemie, hiperbilirubinemie).


Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amed.md> sau prin e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Aecol

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.



Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la loc protejat de lumină, la temperaturi sub 25 °C

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aecol

Substanțele active sunt: retinol acetat, alfa-tocoferol acetat, menadionă, beta-caroten.

- Fiecare ml soluție conține retinol acetat 0,972164 mg (2826 UI), alfa-tocoferol acetat – 1,8 mg, menadionă – 0,5 mg, beta-caroten.
- Celelalte componente sunt: ulei de floarea-soarelui rafinat, deodorizat, marca P, decongelat.

Cum arată Aecol și conținutul ambalajului

Lichid uleios de culoare roșie-oranj.

Câte 50 ml sau 100 ml în flacoane din sticlă. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

SAP "Technolog", Ucraina

20300, reg. Cercasî, or. Umani, str. Manuilskogo, 8.

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2016

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>