

## **PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT**

### **Otilin 1 mg/ml picături nazale, soluție Clorhidrat de xilometazolină**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct.4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Otilin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Otilin
3. Cum să luați Otilin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Otilin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Otilin și pentru ce se utilizează**

Otilin conține xylometazolină, un decongestionant nazal care eliberează rapid nasul înfundat, ajutându-vă pe dumneavoastră sau pe copilul dumneavoastră să respire mai ușor.

Otilin este utilizat pentru ameliorarea simptomatică a congestiei mucoasei nazale, în cazul sinusitei, rinitiei sezoniere și rinitiei perene.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Otilin**

##### **Nu utilizați Otilin**

- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți/este alergic la xilometazolină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- după îndepartarea chirurgicală a glandei pituitare prin nas (hipofizectomie trans-sfenoidală) sau în caz de alte intervenții chirurgicale care expun stratul exterior (dura mater) al creierului
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți/are presiune intraoculară crescută (glaucom), în special glaucom cu unghi încis;
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți/are o inflamație a mucoasei nazale neînsoțită de secreție (*rinita sicca*) sau rinită atrofică;
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți/are feocromocitom, o tumoră a glandelor suprarenale, care determină creșterea tensiunii arteriale
- dacă aveți prostata mărită
- dacă uăti inhibitori de monoaminooxidază (MAO) sau ati încetat să îi luați în ultimele 14 zile

Nu administrați Otilin 1mg/ml, picături nazale copiilor sub 12 ani.

## **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Otilin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți:

- boli cardiovasculare grave (de exemplu: sindrom QT prelungit, boli grave ale arterelor coronare, hipertensiune arterială);
- tulburări metabolice, cum sunt hipertiroidie, diabet zaharat;

Similar altor medicamente utilizate pentru eliberarea nasului înfundat, Otilin provoca tulburări de somn, amețeli sau tremor la pacienții foarte sensibili. Consultați medicul dumneavoastră dacă aceste semne devin supărătoare.

Utilizarea prelungită sau excesivă poate determina reapariția sau agravarea înfundării nasului.

## **Otilin împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Spuneți-i medicului sau farmacistului dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră utilizează medicamente pentru depresie, deoarece se poate produce creșterea tensiunii arteriale (datorită efectelor cardiovasculare induse de xilometazolină).

Nu folosiți în același timp picături nazale care conțin substanțe active din aceeași clasă cu xilometazolina, cum sunt oximetazolina, nafazolina.

## **Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu utilizați Otilin în timpul sarcinii și alăptării fără recomandarea medicului.

## **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Otilin nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**Otilin conține clorură de benzalconiu.** Poate provoca iritarea mucoasei nazale.

## **3. Cum să utilizați Otilin**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Adulți și copii peste 12 ani:**

Se recomandă Otilin 1 mg/ml, picături nazale: câte 2-3 picături de 3 ori pe zi, în fiecare nară. Nu depășiți 3 aplicații zilnic în fiecare nară.

### **Mod de utilizare**

- Suflați nasul.
- Lăsați capul pe spate, într-o poziție confortabilă, sau dacă sunteți în pat, lăsați capul pe spate la marginea patului.

- Administrați picăturile în fiecare nară și mențineți capul lăsat pe spate pentru a permite împrăștierea acestora în nas.
- Puneți la loc capacul după utilizare.

Flaconul nu va fi utilizat decât de dumneavoastră sau de copilul dumneavoastră, pentru a evita răspândirea microbilor și virusurilor prin intermediul picurătorului

Doza recomandată nu trebuie depășită, în special la copii și vârstnici.

#### **Dacă utilizați Otilin mai mult decât trebuie**

Dacă ați utilizat accidental o doză mai mare decât cea recomandată de Otilin sau în cazul unei ingestii accidentale, adresațivă medicului sau farmacistului.

Sимптомите care pot să apară sunt: amețeli severe, transpirații, scăderi severe ale temperaturii corpului, dureri de cap, ritm lent al inimii, tensiune arterială mărită, depresie respiratorie, comă și convulsii.

#### **Dacă uitați să utilizați Otilin**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvențe: foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 pacient din 10); frecvente (care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți); mai puțin frecvente (care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți); rare (care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți); foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți); cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

#### **Reacții adverse frecvente**

- dureri de cap
- uscăciunea nasului sau disconfort nazal
- greață
- arsuri la locul de aplicare

#### **Reacții adverse mai puțin frecvente**

- epistaxis (sângerare nazală)

#### **Reacții adverse foarte rare**

- reacții de hipersensibilitate (angioedeme, urticarie, mîncărimi);
- tulburări de vedere;
- bătăi neregulate ale inimii
- accelerarea ritmului cardiac.
- apneea la sugari mici și nou-născuți.

Alte reacții adverse

Senzația de arsuri în nas și gât.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amdm.gov.md> sau prin e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Otilin**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după "Expiră".

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Otilin**

Substanța activă este clorhidrat de xilometazolină. Un mililitru soluție conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg.

Celealte componente sunt: fosfat de sodiu monobasic, fosfat de sodiu dibasic, edetat de sodiu, clorură de sodiu, tween 80, clorură de benzalconiu 0,01 % (conservant), apă cu grad înalt de purificare,

### **Cum arată Otilin și conținutul ambalajului**

Otilin este o soluție limpede, incoloră, lipsită de particule vizibile, fără miros.

### **Ambalaj**

Cutie cu un flacon din LDPE a 10 ml picături nazale, soluție, prevăzut cu picurător din HDPE.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Amman Pharmaceutical Industries Co., Iordania

King Abdullah II Estate-Sahab,  
Amman 11512.

#### **Fabricantul**

Amman Pharmaceutical Industries Co., Iordania

King Abdullah II Estate-Sahab,  
Amman 11512.

### **Acest prospect a fost aprobat în Martie 2023**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>

