

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Erexil forte 50 mg comprimate filmate Erexil forte 100 mg comprimate filmate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, agresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, agresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nomenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Erexil forte și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Erexil forte
3. Cum să utilizați Erexil forte
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Erexil forte
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE EREXIL FORTE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Erexil forte conține substanță activă sildenafil care aparține grupului de medicamente denumite inhibitori ai fosfodiesterazei de tip 5 (PDE5). Erexil forte acționează prin relaxarea vaselor de sânge de la nivelul penisului, favorizând circulația săngelui în penis atunci când sunteți excitat sexual.

Erexil forte vă ajută să obțineți o erecție numai dacă sunteți stimulat sexual.

Erexil forte este destinat bărbaților adulți cu disfuncție erectilă, cunoscută uneori și sub denumirea de impotență. Această afecțiune constă în lipsa sau în imposibilitatea menținerii erecției penisului în vederea desfășurării actului sexual.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI EREXIL FORTE

Nu utilizați Erexil forte:

- Dacă sunteți alergic la sildenafil sau la oricare dintre celealte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- Dacă utilizați medicamente denumite nitrați, deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale. Informați medicul dacă luați oricare dintre aceste medicamente, care sunt de obicei administrate pentru tratamentul anginei pectorale ("dureri în piept"). Dacă nu sunteți sigur, întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Dacă utilizați oricare dintre medicamentele cunoscute sub numele de donori de oxid nitric, cum este nitritul de amil, deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale.
- Dacă luați riociguat. Acest medicament este utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare (de exemplu, tensiune mare a săngelui la nivelul plămânilor) și a hipertensiunii

pulmonare tromboembolice cronice (de exemplu, tensiune mare a săngelui la nivelul plămânilor secundar cheagurilor de sânge). Inhibitorii de PDE5, cum este Erexil forte, s-au dovedit a mări efectul hipotensor al acestui medicament. Dacă luați riociguat sau nu sunteți sigur de acest lucru, spuneți medicului dumneavoastră.

- Dacă aveți o afecțiune cardiacă sau hepatică severă.
- Dacă ați avut recent un accident vascular cerebral sau infarct miocardic, sau aveți hipotensiune arterială.
- Dacă aveți anumite boli rare ereditare de ochi (cum este retinita pigmentară).
- Dacă ați avut vreodată pierderea vederii datorită neuropatiei optice anterioare ischemice, non-arteritice (NOAIN).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Erexil forte adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale:

- Dacă aveți siclemie (o boală a globulelor roșii din sânge), leucemie (cancer al celulelor din sânge), mielom multiplu (cancer al măduvei osoase);
- Dacă aveți o deformare a penisului sau Boala Peyronie's.
- Dacă aveți boli de inimă. Medicul dumneavoastră trebuie să examineze cu atenție dacă starea inimii dumneavoastră permite susținerea efortului suplimentar al actului sexual.
- Dacă aveți ulcer gastric activ sau tulburări de săngerare (cum este hemofilia).
- Dacă aveți un episod brusc de scădere sau pierdere a vederii, nu mai luați Erexil forte, și contactați imediat medicul.

Nu trebuie să utilizați Erexil forte împreună cu orice alt tratament administrat pe cale orală sau local pentru disfuncția erectilă.

Nu trebuie să utilizați Erexil forte împreună cu tratamente pentru tensiune arterială pulmonară mare (HAP) care conțin sildenafil sau orice alt inhibitor de PDE5.

Nu trebuie să utilizați Erexil forte dacă nu știți că aveți disfuncție erectilă.

Nu trebuie să utilizați Erexil forte dacă sunteți femeie.

Informații speciale pentru pacienții cu afecțiuni ale rinichilor sau ficatului

Trebuie să vă informați medicul dacă suferiți de afecțiuni ale rinichilor sau ficatului. Medicul dumneavoastră vă poate stabili o doză mai mică.

Copii și adolescenți

Erexil forte nu trebuie administrat persoanelor cu vîrstă sub 18 ani.

Erexil forte împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Erexil forte poate interfera cu acțiunea altor medicamente, în special cu cele utilizate pentru durerile în piept. În cazul oricărora urgențe medicale, trebuie să informați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală că ați utilizat Erexil forte și când ați utilizat. Nu utilizați alte medicamente în același timp cu Erexil forte decât cu permisiunea medicului dumneavoastră.

Nu trebuie să luați Erexil forte dacă luați medicamente denumite nitrați deoarece asocierea acestor medicamente poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale. Informați medicul, farmacistul sau asistenta medicală dacă luați oricare dintre aceste medicamente care se

administrează frecvent pentru tratamentul anginei pectorale (“dureri în piept”).

Nu trebuie să luați Erexil forte dacă utilizați oricare dintre medicamentele cunoscute sub numele de donori de oxid nitric, cum este nitritul de amil deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale.

Spuneți medicului sau farmacistului dumneavastră dacă deja luați riociguat.

Dacă utilizați în același timp medicamente cunoscute sub numele de inhibitori de protează, medicamente utilizate pentru tratamentul infecției cu HIV, este posibil ca medicul dumneavastră să vă recomande să începeți cu cea mai mică doză de Erexil forte (25 mg).

Unii pacienți care utilizează medicamente blocante alfa-adrenergice pentru tratarea hipertensiunii arteriale sau pentru mărirea prostatei pot avea amețeli sau stare de confuzie care pot fi determinate de o scădere a tensiunii arteriale care apare atunci când stați în picioare sau când vă ridicați în picioare prea brusc. Unii pacienți au avut aceste manifestări când au luat Erexil forte în același timp cu medicamente alfa-blocante. Manifestările apar cel mai frecvent în primele 4 ore de la administrarea de Erexil forte. Pentru a reduce probabilitatea apariției acestor simptome, tratamentul cu medicamentul alfa-blocant trebuie urmat cu o doză zilnică constantă înainte de a începe tratamentul cu Erexil forte. Medicul s-ar putea să vă recomande să începeți tratamentul cu Erexil forte cu o doză mai mică (25 mg).

Erexil forte împreună cu alimente, băuturi și alcool

Erexil forte poate fi administrată cu sau fără alimente. Totuși, este posibil ca instalarea efectului să fie mai lentă dacă luați Erexil forte în timpul unei mese consistente.

Consumul de băuturi alcoolice poate afecta temporar capacitatea de a obține o erecție. Pentru a beneficia la maximum de efectele medicamentului, vă sfătuim să nu consumați cantități excesive de băuturi alcoolice înainte de a utiliza Erexil forte.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Erexil forte nu este destinat utilizării de către femei.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Erexil forte poate produce amețeli sau tulburări de vedere. Trebuie să știți cum reacționați la administrarea Erexil forte înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI EREXIL FORTE

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată de start este de 50 mg.

Nu trebuie să utilizați Erexil forte mai mult de o dată pe zi.

Trebuie să utilizați Erexil forte cu aproximativ o oră înainte de momentul în care intenționați să aveți un contact sexual. Înghițiți comprimatul în întregime, cu un pahar cu apă.

Dacă simțiți că Erexil forte acționează prea slab sau prea puternic, informați medicul dumneavastră sau farmacistul.

Erexil forte vă ajută să obțineți erecția doar dacă sunteți stimulat sexual. Timpul necesar pentru ca Erexil forte să acționeze diferă de la persoană la persoană, dar în mod obișnuit este între o jumătate

de oră și o oră. Dacă utilizați Erexit forte în timpul unei mese bogate, veți constata că Erexit forte acționează mai lent.

Dacă Erexit forte nu vă ajută să obțineți erecția sau dacă erecția nu persistă suficient de mult timp pentru a permite finalizarea actului sexual, trebuie să informați medicul dumneavoastră.

Dacă utilizați mai mult Erexil forte decât trebuie

Puteți avea o creștere a severității și frecvenței reacțiilor adverse. Dozele peste 100 mg nu duc la creșterea eficacității.

Nu utilizați mai multe comprimate decât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă ati utilizat mai multe comprimate decât trebuia, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări suplimentare referitoare la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reactii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacțiile adverse raportate în asociere cu utilizarea Erexil forte sunt în general ușoare până la moderate și au o durată scurtă.

Dacă manifestați oricare dintre următoarele reacții adverse grave, întrerupeți utilizarea Erexis forte și solicitați asistență medicală imediată:

- Reacție alergică - acestea se manifestă **mai puțin frecvent** (pot afecta până la 1 din 100 de persoane).
Simptomele includ respirație ţuierătoare, dificultăți în respirație sau amețeli, umflare a pleoapelor, feței, buzelor sau gâtului.
 - Dureri în piept - se manifestă **mai puțin frecvent**.
Dacă se manifestă în timpul sau după contactul sexual: Stați în poziție semi-șezând și încercați să vă relaxați.
Nu utilizați nitrati pentru tratamentul durerii în piept.
 - Erecții prelungite și uneori dureroase - acestea se manifestă **rar** (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)
Dacă aveți o erecție care durează mai mult de 4 ore, trebuie să contactați imediat medicul.
 - Scădere bruscă sau pierdere vederii - acestea se manifestă **rar**
 - Reacții grave pe piele - acestea se manifestă **rar**
Simptomele pot să includă descuamare gravă și umflare a pielii, apariția de vezicule la nivelul gurii, organelor genitale și ochilor, febră.
 - Crize convulsive sau convulsii - acestea se manifestă rar

Alte reacții adverse:

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): durere de cap.

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): greață, înroșirea feței, bufeuri (simptomele includ o senzație bruscă de căldură în partea superioară a corpului), dispepsie, senzația de accentuare a colorilor, încețoșarea vederii, tulburări de vedere, înfundarea nasului și amețeli.

Mai puțin frecvente (pot afecta pâna la 1 din 100 de persoane): hipersensibilitate, vărsături, erupții

trecătoare pe piele, iritația ochilor, înroșirea ochilor/ochi roșii, dureri de ochi, vederea unor sclipiri luminoase, luminozitate vizuală, sensibilitate la lumină, lăcrimarea ochilor, bătăi puternice ale inimii, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială mare, tensiune arterială mică, dureri musculare, senzație de somnolență, reducerea sensibilității tactile, vertij, zgomote în urechi, senzație de gură uscată, sinusuri blocate sau înfundate, inflamația mucoasei nazale (simptomele includ nas care curge, strănut și nas înfundat), dureri în partea superioară a abdomenului, boală de reflux gastroesofagian, (simptomele includ arsuri ale stomacului), sânge în urină, dureri ale brațelor sau picioarelor, săngerări nazale, senzație de căldură și senzație de oboseală, durere toracică.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane): leșin, accident vascular cerebral, crize convulsive, infarct miocardic, bătăi neregulate ale inimii, reducerea temporară a circulației sângelui în unele zone ale creierului, senzație de conștiție la nivelul gâtului, gură amorțită, săngerare în partea posterioară a ochiului, vedere dublă, acuitate vizuală redusă, senzații neobișnuite la nivelul ochiului, umflarea ochiului sau pleoapei, vedere unor mici particule sau pete, halouri în jurul luminilor, dilatația pupilei ochiului, decolorarea regiunii albe a ochiului, glaucom, miopie, astenopie, săngerări la nivelul penisului, prezența de sânge în spermă, erecție anormală, persistentă, nas uscat, umflarea regiunii interioare a nasului, senzație de iritabilitate și scăderea sau pierderea bruscă a auzului, Sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică.

În cadrul experienței după punerea pe piață, cazurile de angină instabilă (afectionare a inimii) și moarte subită au fost raportate rar. De notat că majoritatea, dar nu toți bărbații la care au apărut aceste reacții, suferă de probleme cardiace înainte de a lua medicamentul. Nu a fost posibil să se determine dacă aceste evenimente au fost legate direct de utilizarea Erexil forte.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EREXIL FORTE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a respectivei luni.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Erexil forte

Substanța activă:

50 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conține sildenafil 50 mg (sub formă de citrat de sildenafil).

100 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conține sildenafil 100 mg (sub formă de citrat de sildenafil).

Celelalte componente sunt:

Celuloză microcristalină, calciu hidrogen fosfat anhidru, croscarmeloză de sodiu, talc, stearat de magneziu, hipromeloză, dioxid de titan, macrogol, culoare indigo carmin E 132.

Cum arată Erexit forte și ce conține ambalajul

Erexit forte 50 mg comprimate filmate

Comprimate uniforme, alungite, biconvexe, de culoare albastră, cu imprimarea "R-09" pe o parte.

Erexit forte 100 mg comprimate filmate

Comprimate uniforme, alungite, de culoare albastră, cu imprimarea "R-07" pe o parte.

Ambalaj:

Câte 4 comprimate filmate de 50 mg sau 100 mg în blister.

Câte 1 blister însotit de prospect în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Replek Farm Ltd. Skopje, R. Macedonia

188 Kozle str. 1000 Skopje

Fabricantul

Replek Farm Ltd. Skopje, R. Macedonia

188 Kozle str. 1000 Skopje

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>