

Pudră de streptocid pentru uz extern:

Compus

Sulfanilamidă (streptocid) - 2,0 g.

efect farmacologic

Grupa farmacoterapeutică: agent antimicrobian - sulfonamidă

Proprietăți farmacologice: Streptocidul este un agent bacteriostatic antimicrobian. Mecanismul de acțiune se datorează antagonismului competitiv cu acidul para-aminobenzoic (PABA) și inhibării dihidropteroat sintetazei, ceea ce duce la perturbarea sintezei acidului dihidrofolic și apoi tetrahidrofolic și, ca urmare, la perturbarea sintezei acizilor nucleici a microorganismelor.

Activitatea se manifestă împotriva microorganismelor gram-pozitive și gram-negative: Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelii, Toxoplasma israelii.

Farmacocinetică: Când este introdus în organism, streptocidul este absorbit rapid. Cea mai mare concentrație a medicamentului în sânge este creată la 1-2 ore după administrare. După 4 ore este detectat în lichidul céfalorahidian. Este excretat predominant (90-95%) prin rinichi.

Indicații

Streptocidul este utilizat în terapia complexă pentru tratarea rănilor purulente, a arsurilor infectate și a altor procese purulent-inflamatorii ale țesuturilor moi.

Utilizați în timpul sarcinii și alăptării

Contraindicat pentru utilizare în primul și al doilea trimestru de sarcină și alăptare

Contraindicații

Hipersensibilitate la sulfonamide, sarcină, alăptare. Boli ale sistemului hematopoietic, suprimarea hematopoiezii măduvei osoase, anemie, azotemie, tireotoxicoză, insuficiență cardiacă cronică, insuficiență renală, porfirie, insuficiență hepatică, deficit congenital de glucozo-6-fosfat dehidrogenază.

Efecte secundare

Posibile reacții alergice, céfalee, amețeli, grija, vârsături, dispepsie, cianoză, leucopenie, agranulocitoză, cristalurie.

Interacțiu

Medicamentele mielotoxice cresc manifestările de hematotoxicitate a medicamentului.

Cum se administrează, modul de administrare și dozaj

Streptocidul se aplică pe rană sub formă de pulbere zdrobită cu grijă (5-10-15 g), dacă este necesar, în timp ce se prescriu simultan medicamente antimicrobiene pe cale orală.

Supradozaj

Sимптомы: груша, варикоз, колики кишечника, головные боли, головокружение, сонливость, депрессия, головная боль, конфузия, потеря сознания, лихорадка, гематурия, кристаллурия; супердоза продолжительная – тромбоцитопения, лейкопения, анемия мегабластическая,icter.

Лечение: прием жидкости; в случае случайного приема, промывание желудка.

Instrucțiuni Speciale

În timpul terapiei, se recomandă să beți multe lichide alcaline.

Formular de eliberare

Pulbere pentru uz extern

Conditii de depozitare

Lista B. Într-un loc uscat, ferit de lumină, la o temperatură care să nu depășească 25°C. A nu se lasa la indemana copiilor.

Cel mai bun înainte de data

5 ani. Nu utilizați după data de expirare.

Substanța activă

sulfanilamidă

Forma de dozare

pulbere pentru uz extern

Scop

Copii așa cum este prescris de un medic

Indicatii

Piodermie, furuncule, infecții ale pielii, răni purulente, arsuri, escare

Formular de eliberare

Pudra