

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU PACIENT/UTILIZATOR

Anestezol supozitoare Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Anestezol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anestezol
3. Cum să utilizați Anestezol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Anestezol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Anestezol și pentru ce se utilizează

Anestezol este un preparat medicamentos combinat ce conține substanțele active: benzocaină, subgalat de bismut, levomentol, oxid de zinc. Subgalat de bismut, levomentol, oxid de zinc manifestă acțiune antimicrobiană, astringent, care favorizează micșorarea inflamațiilor. Benzocaina manifestă acțiune analgezică.

ANESTEZOL supozitoare se folosește în hemoroizi și fisuri anale.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anestezol

Nu utilizați Anestezol

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6)
- la copii cu vârsta până la 12 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Anestezol adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. În cazul unor simptome necunoscute sau noi, Dumnevoastră trebuie să vă adresați la medic.

Dacă simptomele predomină mai mult de 7 zile este necesară consultarea medicului.

Anestezol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Interacțiuni cu alte medicamente nu sunt înregistrate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicul va decide dacă puteți sau nu utiliza Anestezol supozitoare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

3. Cum să utilizați Anestezol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Anestezol supozitoare se administrează rectal, după clismă evacuatoare sau după defecare spontană.

Înainte de a introduce supozitorul, îndepărtați folia protectoare! Supozitoarele nu se înghit!

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani se administrează câte 1 supozitor de 1-2 ori pe zi.

Nu utilizați Anestezol supozitoare timp îndelungat.

Dacă simptomele nu s-au ameliorat sau se agravează anunțați medicul dumneavoastră.

Dacă ați utilizat mai mult Anestezol decât trebuie

Dacă întâmplător ați înghițit un supozitor sau suspectați că cineva a înghițit, adresați-vă de urgență medicului. Luați cu dumneavoastră ambalajul pentru al arăta medicului.

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Anestezol

Nu vă neliniștiți, administrați medicamentul imediat cum v-ați amintit.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Anestezol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă vă simțiți mai bine puteți să încetați de a utiliza Anestezol supozitoare.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:

Foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți)

Senzație de arsură în rect, efect laxativ, reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigelenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Anestezol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperaturi sub 20 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține ANESTEZOL

-*Substanțele active sunt* benzocaină, subgalat de bismut, levomentol, oxid de zinc. 1 supozitor conține: benzocaină – 100 mg, subgalat de bismut – 40 mg, levomentol – 4 mg, oxid de zinc – 20 mg;

-*Celelalte componente sunt* bază polietilenoxidică (macrogol - 1500, macrogol - 400).

Cum arată ANESTEZOL și conținutul ambalajului

Supozitoare de culoare galbenă sau verde-gălbui, conico-cilindrice.

Câte 5 supozitoare în ambalaj de contur cu fag. Câte 2 ambalaje de contur cu fag însoțite de prospect se plasează în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia

603950, or. Nijni Novgorod

str. Salganskaya, 7

Tel.: (831) 278-80-88

Fax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia

603950, or. Nijni Novgorod

str. Salganskaya, 7

Acest prospect a fost aprobat în ianuarie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>